

ibutin~Gelsectan

Προτεινόμενη χρήση

Το **ibutin~Gelsectan** προορίζεται για την αποκατάσταση της εντερικής λειτουργίας σε ασθενείς που πάσχουν από αλλαγές λόγω του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (IBS), οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με εντερική υπερευαισθησία ή με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων, με σκοπό την ανακούφιση και την πρόληψη συμπτωμάτων, όπως η χρόνια ή η υποτροπιάζουσα διάρροια, η κοιλιακή διάταση, ο πόνος, ο τυμπανισμός και ο μετεωρισμός.

Συσκευασία

Κουτί που περιέχει blister με 15 κάψουλες για χρήση σε ενήλικες.

Σύνθεση

Ξυλογλυκάνη, πρωτεΐνη μπιζελιού και εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών, ξυλο-ολιγοσακχαρίτες, στεατικό μαγνήσιο (φυτική προέλευση) και άμορφο ίζηματοποιημένο πυρίτο.

Οδηγίες χρήσης

Καταπίνετε την κάψουλα με άφθονα υγρά.

Δοσολογία

1 ή 2 κάψουλες αναλόγως της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, δύο φορές την ημέρα (το πρωί πριν το πρωινό και το βράδυ πριν το δείπνο) για 2 έως 4 εβδομάδες. Η αγωγή μπορεί να παραταθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Προειδοποιήσεις

- Δεν είναι αναγκαία η συμβουλή επιστήμονα υγείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Όμως η συμβουλή είναι ενδεδειγμένη σε περίπτωση σοβαρών ή επίμονων συμπτωμάτων ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση, ιδιαιτέρως στους ηλικιωμένους.
- Το **ibutin~Gelsectan** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν και όχι μια φαρμακολογική θεραπεία. Αν συστηθεί από τον επαγγελματία υγείας μία φαρμακολογική θεραπεία τότε το **ibutin~Gelsectan** μπορεί να συγχρηγηθεί με αυτήν.
- Ακόμη και αν δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες για το προϊόν, συνιστάται να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τα ους πρώτους μήνες της γαλουχίας, εκτός εάν έχει υποδειχθεί από έναν επαγγελματία υγείας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά τη λήξη που είναι τυπωμένη στη συσκευασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το blister είναι ανοιγμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν πάνω από 25° C. Μην το παγώσετε.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

Αντενδείξεις

Το **ibutin~Gelsectan** δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη ξυλογλυκάνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά τα οποία αναφέρονται στη λίστα με τη σύνθεση.

Intended use

ibutin~Gelsectan is intended to restore intestinal function in those patients suffering from alterations due to Irritable Bowel Syndrome (IBS) that may be related to intestinal hypersensitivity or the intake of some drugs, to relieve and prevent symptoms such as of chronic or relapsing diarrhoea, abdominal distension, pain, bloating and flatulence.

Presentations

Blister pack containing fifteen capsules for adult use.

Composition

Xyloglucan, Pea Protein and Grape Seed Extract, Xylo-oligosaccharides, Magnesium Stearate (Vegetable origin) and Amorphous Precipitated Silica.

Instructions for use

Swallow the capsule with liquids.

Dosage

1 or 2 capsules, depending on the severity of the symptoms, twice a day (in the morning before breakfast and in the evening before dinner) during 2 to 4 weeks. The treatment can be maintained if needed.

Warnings

- Consultation with a healthcare professional before using the product is not necessary. However such consultation is advisable in case of severe or persistent symptoms or when there are doubts on the diagnosis, mainly in elderly people.
- This medical device is not a pharmacological treatment. If such treatment is recommended by a Healthcare professional, the device can be administered concomitantly with it.
- Even though no side effects are known, it is recommended that the product is not used during pregnancy or in the early months of breastfeeding, unless otherwise indicated by a healthcare professional.
- Do not use the product after the expiry date printed on the package.
- Do not use the product if the blister is opened or damaged
- Do not store above 25°C. Do not freeze
- Keep the product out of reach of children.

Contraindications

ibutin-Gelsectan should not be used in patients with known hypersensitivity to xyloglucan or any other ingredient of the product listed in composition.

Utilizare

ibutin-Gelsectan este destinat restabilirii funcției intestinale la pacienții care suferă de alterări cauzate de sindromul intestinului iritabil (SII) și care pot fi legate de hipersensibilitate intestinală sau de administrarea unor edicamente, pentru a ameliora și a preveni simptomele precum diaree cronică sau recidivantă, distensie abdominală, durere, balonare și flatulență.

Prezentare

Blister cu 15 capsule pentru utilizare la adulți.

Compoziție

Xiloglucan, proteină de mazăre și extract din semințe de struguri, xilo-oligozaharide, stearate de magneziu (de origine vegetală), și dioxid de siliciu amorf.

Instrucțiuni de utilizare

Înghiți capsule cu lichide.

Dozaj

1 sau 2 capsule, în funcție de severitatea simptomelor, de două ori pe zi (dimineața înainte de micul dejun și seara înainte de cină), pe o perioadă de 2 până la 4 săptămâni. Tratamentul poate fi continuat, dacă este nevoie.

Atenționări

- Nu este necesară consultarea unui medic specialist înainte de a folosi produsul. Cu toate acestea, se recomandă consultarea medicului în cazul simptomelor severe sau persistente sau atunci când există îndoile în ceea ce privește diagnosticul, în special la vârstnici.
- Acest dispozitiv medical nu este un tratament farmacologic. Dacă un astfel de tratament este recomandat de către un medic specialist, dispozitivul poate fi administrat concomitent cu acesta.
- Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, se recomandă ca produsul să nu fie utilizat în timpul sarcinii sau în primele luni de alăptare, cu excepția cazurilor în care medicul specialist a recomandat altfel.
- Nu utilizați produsul după data de expirare înscrișă pe ambalaj.
- Nu utilizați produsul dacă blisterul este deschis sau deteriorat.
- A nu se păstra la temperaturi peste 25° C. Nu păstrați în congelator.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Contraindicații

ibutin-Gelsectan nu trebuie utilizat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la xiloglucan sau la oricare alt ingredient al produsului enumerat în compoziție.

 DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia, 14
6900 Lugano, Switzerland

 Galenica s.a.
Eleftherias 4, Kifissia 145 64, Greece
Tel.: + 30 210 5281700

