

Tasectan®

Ενδειγμένη χρήση

Το Tasectan® είναι ένα ιατροτεχνολογικό σκεύασμα, που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των τοιχωμάτων του εντέρου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο και την μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την διάρροια διαφόρου αιτιολογίας, όπως κοιλιακή διάταση και συχνές κενώσεις. Είναι αποτελεσματικό εντός 12 ωρών.

Το σύμπλοκο ζελατίνης-ταννικού οξέος από το οποίο αποτελείται το σκεύασμα δεν μεταβάλλεται στο στομάχι και δρα σχηματίζοντας ένα μανδύα που προστατεύει τον εντερικό βλεννογόνο, μειώνοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια των επεισοδίων της διάρροιας.

Φύση και περιεχόμενο της συσκευασίας

- 20 φακελλίσκοι που περιέχουν σκόνη για παιδιατρική χρήση
- Blister με 15 κάψουλες για χρήση από ενήλικες

Σύνθεση

Σκόνη για παιδιατρική χρήση: 250 mg Gelatine tannate (χοίρειας προέλευσης)

Κάψουλες: 500 mg Gelatine tannate (χοίρειας προέλευσης), Corn Starch και Magnesium stearate (φυτικής προέλευσης)

Οδηγίες χρήσης

Κάψουλες: Καταπιείτε την κάψουλα με υγρά.

Σκόνη: Το περιεχόμενο ενός φακελλίσκου πρέπει να αναμιχθεί με μικρή ποσότητα υγρού, που να μην είναι καυτό, όπως γάλα, φρουτοχυμό ή νερό και να χορηγηθεί αμέσως. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε γιαούρτι ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Μην χορηγείτε το σκεύασμα απευθείας, χωρίς να το έχετε αναμίξει.

Δοσολογία

Ενήλικες και παιδιά άνω των 14 ετών: 1-2 κάψουλες κάθε 4-6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Παιδιά κάτω των 3 ετών: 1 φακελλίσκος κάθε 6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Παιδιά από 3 μέχρι 14 ετών: 1 ή 2 φακελλίσκοι κάθε 6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων

Προειδοποιήσεις

- Η συμβουλή επαγγελματία υγείας πριν από τη χρήση του σκευάσματος δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, τέτοια συμβουλή συστήνεται σε περίπτωση σοβαρών ή επίμονων συμπτωμάτων, ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση.
- Σε περίπτωση διάρροιας σε παιδιά κάτω των 3 ετών και ηλικιωμένα άτομα, και ιδιαίτερω όταν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, συστήνεται να ζητηθεί η συμβουλή επαγγελματία υγείας.
- Αυτό το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα δεν είναι φαρμακευτική θεραπεία. Αν συστηθεί τέτοια θεραπεία από επαγγελματία υγείας, το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα μπορεί να συχορηγηθεί.
- Συστήνεται άφθονη πρόσληψη υγρών και τα συνήθη διαιτητικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διάρροιας.
- Αν και δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, συστήνεται το προϊόν να μη χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, εκτός αν δοθεί διαφορετική οδηγία από επαγγελματία υγείας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα μετά την ημερομηνία λήξης, που είναι τυπωμένη στη συσκευασία.
- Μην χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα, εάν το blister ή οι φακελλίσκοι είναι ανοιγμένα ή έχουν καταστραφεί.
- Αυτό το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μην το ψύχετε.
- Φυλάξτε το σκεύασμα μακριά από τα παιδιά.

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες

Το Tasectan® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ασθενείς με διαγνωσμένη υπερευαισθησία στο gelatin tannate ή στα άλλα συστατικά του σκευάσματος.